

1 דמיון מטריצות

הגדרה 1. אומרים שמטריצה A דומה למטריצה B אם קיימת מטריצה הפיכה P שעבורה מתקיים $B = P^{-1}AP$. מסמנים זאת $A \sim B$.

הערה 1. דמיון הוא יחס שקילות, כלומר הוא:

$$1. \text{ רפלקסיבי - } A \sim A$$

הוכחה. ניקח $P = I$ ונקבל את הדרוש.

□

$$2. \text{ סימטרי - אם } A \sim B \text{ אזי } B \sim A$$

הוכחה. אם $B = P^{-1}AP$ אזי $A = PBP^{-1}$.

□

$$3. \text{ טרנזיטיבי - אם } A \sim B \text{ וגם } B \sim C \text{ אזי } A \sim C$$

הוכחה. אם $B = P^{-1}AP$ וגם $C = Q^{-1}BQ$ אזי $C = Q^{-1}P^{-1}APQ = (PQ)^{-1}A(PQ)$.

□

הערה 2. אם V מרחב וקטורי מעל \mathbb{F} , $T : V \rightarrow V$ אופרטור לינארי, B_1, B_2 שני בסיסים של V , A_1, A_2 המטריצות המייצגות של T יחסית ל- B_1, B_2 בהתאמה ואם P מטריצת המעבר מ- B_1 ל- B_2 , אזי $A_2 = P^{-1}A_1P$.

ההערה הזו בעצם נותנת לנו אינטואיציה מה המשמעות של דמיון מטריצות: שתי מטריצות הן דומות אם ורק אם הן מייצגות את אותה העתקה בבסיסים שונים. אם כן, במהלך הקורס כשנדבר על דמיון נתייחס למטריצות, ואם נרצה לדבר בשפת העתקות נדבר על מציאת בסיס מתאים.

הערה 3. אם $A \neq I$, אזי A אינה דומה ל- I .

הוכחה. נניח בשלילה ש- $A \sim I$. זאת אומרת שקיימת P כך ש- $I = P^{-1}AP$. נכפול ב- P משמאל, ונקבל $P = AP$. נכפול ב- P^{-1} מימין, ונקבל $I = A$, בסתירה.

□

המשמעות של ההערה הקודמת - המטריצה המייצגת היחידה של העתקת הזהות היא מטריצת היחידה. אכן, ניתן לוודא זאת בקלות גם באמצעות כלים של לינאריות 1. כעת נכליל את הטענה:

הערה 4. אם A איננה מטריצה סקלרית (זאת אומרת, $A \neq \alpha I$), אזי A אינה דומה לאף מטריצה סקלרית.

ההוכחה דומה לזו של ההערה הקודמת. נעיר שגם פה, כל מטריצה סקלרית היא מטריצה מייצגת של העתקת מתיחה / כיווץ, כלומר העתקת הזהות כפול סקלר כלשהו. גם במקרה זה ניתן לחשב ישירות את המטריצה המייצגת, ולגלות שהיא תמיד אותה סקלרית.

משפט 1. אם A_1, A_2 מטריצות דומות אזי $\text{spec}(A_1) = \text{spec}(A_2)$.

הוכחה. יהי λ ע"ע של A_1 בה"כ, לכן לפי משפט $\det(\lambda I - A_1) = 0$. $A_1 \sim A_2$, לכן קיימת מטריצה P הפיכה שעבורה $A_2 = P^{-1}A_1P$. נשים לב כי

$$\begin{aligned} \det(\lambda I - A_2) &= \det(\lambda P^{-1}P - P^{-1}A_1P) = \\ &= \det(P^{-1}(\lambda I - A_1)P) = \det(P^{-1}) \det(\lambda I - A_1) \det(P) = 0 \end{aligned}$$

ולכן לפי משפט λ ע"ע של A_2 .
מכאן נגיע למסקנה כי $\text{spec}(A_1) = \text{spec}(A_2)$.

□

במילים אחרות, אם שתי מטריצות הן דומות, יש להן אותם ערכים עצמיים (אך לא אותם וקטורים עצמיים בהכרח!). אם כן, נוכל להגיע למסקנה הבאה:

מסקנה 2. $\text{spec}(T) = \text{spec}(A)$ למטריצה מייצגת A כלשהי.

הערה 5. אם $A_1 \sim A_2$, אזי $\det(A_1) = \det(A_2)$.

בעת ננסה להתעסק בשאלה כללית: מתי מטריצה נתונה A דומה למטריצה אלכסונית.

2 לכסון מטריצות

הגדרה 2. אומרים שמטריצה A **לכסינה** (או ניתנת ללכסון) אם A דומה למטריצה אלכסונית D , כלומר אם קיימת מטריצה הפיכה P כך ש- $P^{-1}AP$ מטריצה אלכסונית. המטריצה P נקראת **המטריצה המלכסנת**.

הערה 6. לכסון עוזר בהעלאה בחזקה של מטריצה. הסבר: נניח ש- A לכסינה ו- $k \in \mathbb{N}$. נניח ש- P היא המטריצה המלכסנת של A , ונניח שהמטריצה $D = P^{-1}AP$ היא מטריצה אלכסונית. אזי:

$$A^k = (PDP^{-1})^k = \underbrace{(PDP^{-1})(PDP^{-1}) \dots (PDP^{-1})}_{k \text{ times}} = PD^kP^{-1}$$

לכאורה, לא נפטרנו מהבעיה; עדיין צריך להעלות מטריצה בחזקה גבוהה. אבל D אלכסונית, נניח

$$D = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha_n \end{pmatrix}$$

אזי

$$D^k = \begin{pmatrix} \alpha_1^k & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha_n^k \end{pmatrix}$$

וזה קל לחישוב!

משפט 3 (קריטריון בסיסי ללכסון מטריצה). מטריצה A לכסינה אם ורק אם יש ב- F^n בסיס המורכב מוקטורים עצמיים של A .
אם

$$P^{-1}AP = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

אזי איברי הבסיס ה"ל הם עמודות המטריצה P .

הוכחה. \Leftarrow נניח שהמטריצה A לכסינה,

$$P^{-1}AP = D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

נסמן e_1, \dots, e_n וקטורי היחידה. ניקח $i = 1, \dots, n$, ונשים לב כי

$$P^{-1}APe_i = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ \lambda_i \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_i e_i$$

לכן e_i ו"ע של $P^{-1}AP$ הקשור לע"ע λ_i ($A \sim P^{-1}AP$, לכן λ_i ע"ע של A).
קיבלנו כי

$$P^{-1}APe_i = \lambda_i e_i$$

נכפול ב- P משמאל, ואז

$$A(Pe_i) = \lambda_i (Pe_i)$$

נסמן $v_i = Pe_i$, לכן

$$Av_i = \lambda_i v_i$$

$$v_i = \begin{pmatrix} | & & | \\ p_1 & \cdots & p_n \\ | & & | \end{pmatrix}$$

\Rightarrow נניח שקיים בסיס $\{v_1, \dots, v_n\}$ המורכב מו"ע של A . נוכיח ש- A לכסינה. נגדיר

$$P = \begin{pmatrix} | & & | \\ v_1 & \cdots & v_n \\ | & & | \end{pmatrix}$$

$Pe_i = v_i$, לכן $e_i = P^{-1}v_i$. נשים לב כי:

$$AP = A \begin{pmatrix} | & & | \\ v_1 & \cdots & v_n \\ | & & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & & | \\ Av_1 & \cdots & Av_n \\ | & & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & & | \\ \lambda_1 v_1 & \cdots & \lambda_n v_n \\ | & & | \end{pmatrix}$$

ובעת, נראה כי

$$P^{-1}AP = P^{-1} \left(\begin{array}{c|ccc} & & & \\ \lambda_1 v_1 & \cdots & \lambda_n v_n & \\ & & & \end{array} \right) =$$

$$= \left(\begin{array}{c|ccc} & & & \\ \lambda_1 P^{-1}v_1 & \cdots & \lambda_n P^{-1}v_n & \\ & & & \end{array} \right) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

ולכן מצאנו מטריצה הפיכה P כך ש- $P^{-1}AP$ אלכסונית, כדרוש.

□

הערה 7. איברי האלכסון הראשי של מטריצה אלכסונית הם הערכים העצמיים שלה.

1.2 דוגמה - בלוק ד'ורדן

הגדרה 3. מטריצה מהצורה

$$J_n(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda \end{pmatrix}$$

(מגודל $n \times n$) נקראת **בלוק (או תא) ד'ורדן** מגודל n .

טענה 4. אם $n \geq 2$, אז J_λ איננה לכסינה.

הוכחה. נחפש ו"ע של $J_n(\lambda)$. יהי

$$v = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

ו"ע של $J_n(\lambda)$. λ הוא הע"ע היחיד של $J_n(\lambda)$ (כי הוכחנו באשר דיברנו על ע"ע שעבור מטריצה משולשת, הע"ע הם האיברים שעל האלכסון הראשי שלה). נשים לב:

$$J_n(\lambda)v = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & 0 \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ 0 & & & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda\alpha_1 + \alpha_2 \\ \vdots \\ \lambda\alpha_{n-1} + \alpha_n \\ \lambda\alpha_n \end{pmatrix} = \lambda v = \begin{pmatrix} \lambda\alpha_1 \\ \vdots \\ \lambda\alpha_{n-1} \\ \lambda\alpha_n \end{pmatrix}$$

קיבלנו מערכת משוואות:

$$\begin{cases} \lambda\alpha_1 + \alpha_2 = \lambda\alpha_1 \\ \vdots \\ \lambda\alpha_{n-1} + \alpha_n = \lambda\alpha_{n-1} \\ \lambda\alpha_n = \lambda\alpha_n \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = \cdots = \alpha_n = 0$$

לכן כל ו"ע של $J_n(\lambda)$ הוא מהצורה

$$v = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

אבל

$$V_\lambda(J_n(\lambda)) = \{v \in \mathbb{F}^n \mid J_n(\lambda)v = \lambda v\}$$

מרחב וקטורי ממימד 1, לכן למרחב הוקטורי \mathbb{F}^n אין בסיס המורכב מו"ע של $J_n(\lambda)$, ולכן $J_n(\lambda)$ אינו לבסין.

□

בעצם, מה הפריע לנו? לא היו מספיק וקטורים עצמיים לערך העצמי λ . בלוק ז'ורדן הוא דוגמה חשובה, והיא תחזור בהמשך הקורס ותקבל תפקיד משמעותי ביותר.