

## 1 ערכים עצמיים ווקטורים עצמיים של מטריצות

**הגדרה 1.** תהי  $A \in M_n(\mathbb{F})$ . אומרים ש- $\lambda \in \mathbb{F}$  הוא **ערך עצמי (ע"ע)** של  $A$ , אם קיים וקטור  $v \in \mathbb{F}^n$ ,  $v \neq 0$  שעבורו  $Av = \lambda v$ .  
הוקטור  $v$  נקרא **וקטור עצמי (ו"ע)** של  $A$  הקשור ל- $\lambda$ .

**הגדרה 2.** אוסף כל הערכים העצמיים של  $A$  נקרא **הספקטרום** של  $A$ , ומסומן  $\text{spec}(A)$ .

הערה 1. יכול להיות המצב  $\text{spec}(A) = \emptyset$ .

הרעיון בערכים עצמיים ווקטורים עצמיים הוא לדעת אילו וקטורים המטריצה מותחת או מכווצת. הווקטור העצמי - מי ההעתקה מותחת או מכווצת, והערך העצמי - פי כמה. בהמשך נראה שלערכים העצמיים ולווקטורים העצמיים יש תפקיד משמעותי ב"הבנת" מטריצות.

**משפט 1.**  $\lambda = 0$  ערך עצמי של  $A$  אם ורק אם  $A$  איננה הפיכה.

**הוכחה.**  $\Leftarrow$  נניח  $\lambda = 0$  הוא ע"ע של  $A$ . זאת אומרת שקיים וקטור  $v \neq 0$  שעבורו  $Av = 0$ . נסמן

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

נוכל להגיד שלפיכך

$$\begin{cases} a_{11}v_1 + \cdots + a_{1n}v_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}v_1 + \cdots + a_{nn}v_n = 0 \end{cases}$$

היא מערכת הומוגנית (בת  $n$  משוואות  $n$ -מ נעלמים). למערכת יש פתרון לא טריוויאלי, ולכן  $A$  אינה הפיכה.

$\Rightarrow$  נניח ש- $A$  אינה הפיכה. נתבונן במערכת  $Av = 0$ . יש לה פתרון לא טריוויאלי  $v \neq 0$ , ולכן מתקיים  $Av = 0 = 0 \cdot v$ , זאת אומרת ש- $\lambda = 0$  הוא ע"ע של  $A$ .

□

הערה 2.  $A$  איננה הפיכה אם ורק אם  $\det(A) = 0$ .

**משפט 2.**  $\lambda \in \mathbb{F}$  הוא ערך עצמי של מטריצה  $A \in M_n(\mathbb{F})$  אם ורק אם  $\det(\lambda I - A) = 0$ .

**הוכחה.**  $\lambda \in \mathbb{F}$  הוא ע"ע של  $A \Leftrightarrow$  קיים  $v \neq 0$  כך ש- $Av = \lambda v \Leftrightarrow Av - \lambda v = 0$  -  $\Leftrightarrow (\lambda I - A)v = 0$  -  $\Leftrightarrow$  המטריצה  $\lambda I - A$  אינה הפיכה  $\Leftrightarrow \det(\lambda I - A) = 0$ .

□

המשפט מאפשר לנו לחשב ערכים עצמיים מבלי לנסות לכפול וקטורים במטריצה בתקווה ש"יציא טוב". לפי המשפט, כדי למצוא ערכים עצמיים של המטריצה נוכל לפתור את המשוואה  $\det(\lambda I - A) = 0$ . זהו פולינום ממעלה  $n$ , ובהמשך נקרא לו "הפולינום האופייני" של  $A$ , והוא ישחק תפקיד חשוב בתיאוריה שלנו.  
נציג כעת מספר דוגמאות למציאת ערכים עצמיים.

**דוגמה 1** (מטריצת היחידה). ניקח  $A = I_n$ , ונחפש את  $\text{spec}(A)$ . נבדוק בשתי שיטות:

שיטה ראשונה - חישוב ישיר נניח ש- $I_n v = \lambda v$ , מכאן,  $v = \lambda v$ , כלומר  $\lambda = 1$ , כלומר  $\text{spec}(I_n) = \{1\}$ .

שיטה שנייה - לפי המשפט נשים לב כי

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda - 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda - 1 \end{pmatrix}$$

לכן,  $\det(\lambda I - A) = (\lambda - 1)^n$ , אם כן,  $\lambda = 1 \Leftrightarrow (\lambda - 1)^n = 0$ , ולכן  $\text{spec}(I_n) = \{1\}$ .

לסיכום, הערך העצמי של מטריצת היחידה הוא 1, ומהחישוב שבחלק הראשון גלינו שכל הווקטורים הם וקטורים עצמיים שלו. זה אכן מתאים לדברים המוכרים - כל וקטור הכופלים במטריצת היחידה נשאר עצמו, המתיחה היא תמיד פי 1.

**דוגמה 2** (מטריצה אלכסונית כללית). נסמן

$$A = D = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha_n \end{pmatrix}$$

נרצה לדעת מהו  $\text{spec}(D)$ . על פי המשפט, נסתכל על  $\lambda I - D$ :

$$\lambda I - D = \begin{pmatrix} \lambda - \alpha_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda - \alpha_n \end{pmatrix}$$

הדטרמיננטה:  $\lambda = \alpha_1, \dots, \alpha_n \Leftrightarrow \det(\lambda I - A) = \prod_{i=1}^n (\lambda - \alpha_i) = 0$   
קיבלנו ש- $\text{spec}(D) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ .

אכן, גם את התוצאה הזו יכולנו לצפות מראש! מטריצה אלכסונית מוחתת בדיוק את וקטורי היחידה,  $e_1, \dots, e_n$ , פי  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ . בהתאמה.

**דוגמה 3** (מטריצה משולשת עליונה). ניקח

$$A = T = \begin{pmatrix} \alpha_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \alpha_n \end{pmatrix}$$

מטריצה משולשת עליונה.

על פי הוכחה דומה לזו של מטריצה אלכסונית - מקבלים  $\text{spec}(T) = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ .

**דוגמה 4**. ניקח מעל  $\mathbb{F} = \mathbb{R}$  את המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

אזי

$$\lambda I - A = \begin{pmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

לפי חישוב,  $\det(\lambda I - A) = \lambda^2 + 1 = 0$ , אבל למשוואה זו אין פתרונות ב- $\mathbb{R}$ .  
אם כן,  $\text{spec}(A) = \emptyset$ .

## 2 מרחבים עצמיים

**הגדרה 3.** תהי  $A$  מטריצה ריבועית, ויהי  $\lambda \in \mathbb{F}$  ע"ע של  $A$ . נגדיר

$$V_\lambda(A) = \{v \in \mathbb{F}^n \mid Av = \lambda v\}$$

$V_\lambda(A)$  נקרא **המרחב העצמי** של  $A$  הקשור ל- $\lambda$ . בעצם, זוהי קבוצת כל הווקטורים העצמיים של  $A$  הקשורים ל- $\lambda$ , ביחד עם וקטור האפס.

**הערה 3.**  $V_\lambda(A)$  הוא תת-מרחב וקטורי של  $V = \mathbb{F}^n$ .

**הוכחה.**  $0 \in V_\lambda(A)$  - טריוויאלי, מכיוון ש- $\lambda \cdot 0 = 0 = A \cdot 0$ . כמו כן, אם  $v_1, v_2 \in V_\lambda(A)$ ,  $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$  מתקיים

$$A(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha A v_1 + \beta A v_2 = \alpha \lambda v_1 + \beta \lambda v_2 = \lambda(\alpha v_1 + \beta v_2)$$

ומכאן  $\alpha v_1 + \beta v_2 \in V_\lambda(A)$ .

□

## 3 הפולינום האופייני

**הגדרה 4.** תהי  $A$  מטריצה ריבועית מגודל  $n \times n$ .  $p_A(x) = \det(xI_n - A)$  נקרא **הפולינום האופייני** של המטריצה  $A$ .

חשוב לשים לב שזהו פולינום; האיברים במטריצה  $xI_n - A$  הם פולינומים לכל היותר ממעלה 1. דטרמיננטה היא, בסך הכל, סכום של מכפלות של איברים מתוך המטריצה. לכן, גם התוצאה היא פולינום.

פולינום זה אמור להיות מוכר; כאשר דיברנו על ערכים עצמיים ועל וקטורים עצמיים, הוא היה חלק מהאלגוריתם למציאת ערכים עצמיים.

**משפט 3** (תכונות הפולינום האופייני). לפולינום האופייני התכונות הבאות:

1. השורשים של  $p_A(x)$  הם הע"ע של  $A$ .

2. אם  $A$  מטריצה משולשת,

$$A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$$p_A(x) = \prod_{i=1}^n (x - \lambda_i)$$

3.  $p_A(x)$  הוא פולינום מתוקן. זאת אומרת, המקדם הראשי / המוביל שלו שווה ל-1.

$$4. \deg(p_A(x)) = n$$

5. אם  $p_A(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$  אזי  $a_0 = (-1)^n \cdot \det(A)$  ו- $a_{n-1} = -tr(A)$

הוכחה. 1 לפי טענה שראינו בהרצאה הראשונה.

2 המטריצה

$$xI - A = \begin{pmatrix} x - \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & x - \lambda_n \end{pmatrix}$$

גם היא משולשת, ולכן הדטרמיננטה שלה היא מכפלת איברי האלכסון. אם כן,

$$p_A(x) = \det(xI - A) = \prod_{i=1}^n (x - \lambda_i)$$

3,4,5

$$p_A(x) = \det(xI_n - A) = \det \begin{pmatrix} x - a_{11} & \cdots & -a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & \cdots & x - a_{nn} \end{pmatrix} =$$

$$= \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) c_{1\sigma(1)} \cdots c_{n\sigma(n)} = x^n + x^{n-1}(-a_{11} - a_{22} - \cdots - a_{nn}) + \cdots + a_0$$

מהפיתוח הנ"ל, סעיפים 3 ו-4 נובעים באופן מיידי. נותר להוכיח את סעיף 5:

$$a_0 = p_A(0) = \det(0I_n - A) = \det(-A) = (-1)^n \det(A)$$

□