

**הגדרה 1.1.** פונקציה  $f : A \rightarrow B$  נקראת "חד-חד ערכית" (או בקיצור חח"ע) אם לכל  $x \neq y$  ב- $A$  מתקיים ש- $f(x) \neq f(y)$ .

2. הפונקציה נקראת "על" אם  $\forall y \in B \exists x \in A : f(x) = y$ .

3. במקרה שפונקציה היא חח"ע ועל אומרים שהיא "הפיכה", משום שאפשר להגדיר  $f^{-1} : B \rightarrow A$  כך ש- $f^{-1} \circ f = Id_A, f \circ f^{-1} = Id_B$ , או במילים אחרות  $\forall x \in A : f^{-1}(f(x)) = x, \forall y \in B : f(f^{-1}(y)) = y$ .

**הגדרה 2.** פונקציה  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  נקראת מונוטונית עולה ממש אם  $\forall x < y : f(x) < f(y)$  ובאופן אנלוגי מונוטונית יורדת ממש.

סימון: כאשר נסמן  $\langle a, b \rangle$  הכוונה היא לאחת מהאפשרויות  $(a, b), (a, b], [a, b), (a, b]$  (כל אחת תתאים).

**משפט 1.** נניח ש- $\mathbb{R} \rightarrow \langle a, b \rangle : f$  רציפה אזי חח"ע אם ורק אם  $f$  מונוטונית עולה ממש או מונוטונית יורדת ממש.

הוכחה.  $\Rightarrow$  טריוויאלי מההגדרה  $\Leftarrow$  נניח  $f$  לא מונוטונית ממש, ולכן

$$\exists x_1 < x_2 : f(x_1) \leq f(x_2), \exists x_3 < x_4 : f(x_3) \geq f(x_4)$$

(כך לא מונוטונית יורדת ולא מונוטונית עולה). לכן

$$\exists \alpha, \beta, \gamma \in \{x_1, x_2, x_3, x_4\} : \alpha < \beta < \gamma \wedge f(\beta) \geq f(\alpha), f(\gamma)$$

ואם נניח בה"כ ש- $f(\alpha) < f(\gamma)$  אזי נזכור ש- $f$  רציפה ועבור  $t \in (f(\alpha), f(\gamma))$  לפי משפט ערך הביניים  $\exists c_1 \in [\alpha, \beta] : f(c_1) = t, \exists c_2 \in [\beta, \gamma] : f(c_2) = t$  ומכאן ש- $f$  אינה חח"ע.  $\square$

הבחנה:

תהי  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  רציפה בקטע ומונוטונית ממש בו. ממשפט וויירשטראס ניתן להגדיר  $d = \sup f, c = \inf f$  סופיים ואז אפשר לצמצם את טווח הפונקציה מכל  $\mathbb{R}$  אל  $[c, d]$ . כעת מהמשפט השני של וויירשטראס  $f$  מקבלת את הערכים האלו ולכן  $c, d \in \text{Im } f$  וממשפט ערך הביניים נסיק כי  $f : [a, b] \rightarrow [c, d]$  פונקציה על וכיוון שהיא גם מונוטונית ממש אז היא חח"ע ואז הפיכה. כעת אפשר לדבר על  $f^{-1}$  במקרה הזה.

**משפט 2.** באותם התנאים של ההבחנה הקודמת, הפונקציה  $f : [a, b] \rightarrow [c, d] : f^{-1}$  רציפה ומונוטונית ממש.

הוכחה. מספיק להראות עבור  $f$  מונוטונית עולה ממש ועבור יורדת ממש נוביח באופן אנלוגי.

יהיו  $y_1 < y_2 \in [c, d]$  ונראה כי  $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$  משום שאחרת מזה ש- $f$  מונוטונית עולה ממש נקבל ש- $y_2 = f(f^{-1}(y_2)) \geq f(f^{-1}(y_1)) = y_1$  בסתירה לכך ש- $y_1 > y_2$ . כעת בתור פונקציה מונוטונית עולה ממש, ובפרט מונוטונית, נק' אי הרציפות של הפונקציה הם רק מסדר ראשון. נניח  $y_0$  נק' אי רציפות מסדר ראשון ואז  $x \in (\lim_{y \rightarrow y_0^-} f(y), f(y_0))$  נראה שאין לו מקור משום שהפונקציה מונוטונית עולה ממש, בסתירה להגדרה של פונקציה הפוכה!  $\square$